



La recherche sur la maltraitance envers les aînés au Québec :

résumés d'articles scientifiques



La violence familiale chez les patients adultes âgés consultant dans des cliniques de soins de première ligne : résultats de l'Enquête sur la santé des aînés et de l'utilisation des services de santé.

Référence

Préville, M., Mechakra-Tahiri, S., Vasiliadis, H.-M., Mathieu, V., Quesnel, L., Gontijo-Guerra, S., Lamoureux-Lamarche, C. & Berbiche, D. (2014). La violence familiale chez les patients adultes âgés consultant dans des cliniques de soins de première ligne : résultats de l'Enquête sur la santé des aînés et l'utilisation des services de santé. *La Revue canadienne de psychiatrie*, 59(8), 426-433.

Type de texte

Format : Article scientifique

Contenu : Développement et/ou validation d'outil

Thèmes abordés

Détection, violence familiale, échelle de violence familiale (EVF), violence psychologique, violence financière, violence physique.

But ou question de recherche

La documentation de la validité et de la fiabilité de l'*échelle de violence familiale* (EVF) auprès des personnes aînées du Québec est au centre de cet article. L'étude présentée ici permet d'établir des données sur la prévalence de la violence familiale, ainsi qu'identifier les besoins non répondus chez les personnes aînées en attente de services médicaux dans des cliniques de soins de première ligne.

Problématique

La violence familiale est une problématique de santé publique importante, car les conséquences au plan physique et mental sont réelles. La violence familiale chez les personnes aînées est tout aussi préoccupante puisqu'elle engendre de la détresse psychologique, une utilisation fréquente des services de santé et un risque de mortalité élevé. De plus, les facteurs de risques varient selon la population identifiée et le type de violence commise. La pauvreté, l'âgisme, l'isolement, la langue et le faible soutien social figurent parmi les facteurs de risque de violence familiale chez les personnes aînées. Finalement, cette problématique affecte les dimensions physique, économique, psychologique et sociale des personnes aînées.

Méthodologie

Les données de l'*Enquête sur la santé des aînés et l'utilisation des services de santé*, réalisée entre 2011 et 2013 (Québec), furent la principale source d'information dans cette étude. Cette enquête est basée sur un échantillon probabiliste de 1765 personnes âgées en attente de services médicaux dans des cliniques de soins de première ligne. Pour établir l'échantillon, l'implication des médecins a été requise afin de recruter des participants. Les personnes âgées qui ont visité un des médecins participants au cours de la période ont reçu un dépliant informatif les invitant à participer à l'étude. Au total, 1 811 personnes âgées ont accepté d'être interviewées à domicile. Certaines d'entre elles furent exclues puisqu'elles ne satisfaisaient pas les critères d'inclusion. Dans le cadre de l'étude, la violence familiale est considérée comme une variable latente, influencée par le conjoint et les enfants.

Résultats

Les résultats de l'étude montrent que 16 % des participants consultés vivent de la violence familiale au cours des 12 derniers mois. Plus spécifiquement, de la violence psychologique de la part de leur conjoint dans 10 % des cas. De ce nombre, 1,1 % sont également confrontés à de la violence financière et 1,2 % à de la violence physique au cours de la même période. Sur le nombre total de participants, 7,3 % d'entre eux disent subir de la violence psychologique de la part de leurs enfants et 9 % de la violence tant de la part de leur conjoint que de leurs enfants.

L'analyse démontre que la variable du genre n'est pas liée au degré de violence, contrairement à celle de l'âge. Les personnes âgées entre 65 et 74 ans rapportent plus de violence familiale que celles de 75 ans et plus.

Discussion

L'étude fournit plusieurs informations sur la validité et la fiabilité de l'EVF. À titre d'exemple, sa fiabilité est évaluée à 0,95, ce qui permet de conclure que le modèle de mesure de la violence familiale, composée de la violence d'un conjoint et de la violence des enfants, est adapté aux données observées dans cette étude. Aussi, plusieurs résultats, comme ceux concernant la violence psychologique commise par un conjoint, sont similaires à ceux observés dans d'autres études. Selon les auteurs, l'EVF peut être utilisée auprès de la population âgée afin d'estimer la prévalence de la violence familiale psychologique, financière et physique.

Conclusion

Les résultats confirment que la problématique de la violence familiale envers les personnes âgées requiert une plus grande attention, autant en ce qui concerne le politique, que la santé publique. Ces résultats mettent également en évidence le besoin de former les professionnels, tels les médecins, afin d'accroître leurs capacités à reconnaître et détecter cette problématique.

Pistes pour la pratique ou la recherche

Les pistes pour la pratique ou la recherche sont abordées dans la conclusion ci-haut.

Date de réalisation de la fiche :

17 août 2015

