



La recherche sur la maltraitance envers les aînés au Québec : résumés d'articles scientifiques

Comment évaluer le danger chez les personnes âgées à domicile?

Référence

Plamondon, L., Lauzon, S., Rapin, C.-H. & Bourdeau, M. (2006). Comment évaluer le danger chez les personnes âgées à domicile? *Vie et Vieillesse*, 5(2), 29-38.

Type de texte

Format: Article scientifique

Contenu: Validation d'outil

Thèmes abordés

Facteurs de risque, facteurs de vulnérabilité, profil de la personne maltraitée, auteurs de la maltraitance, dépistage, fardeau et stress

But ou question de recherche

L'objectif de cette étude est de valider la pertinence des variables issues de la littérature en matière de maltraitance dans le but d'élaborer un test de dépistage qui pourrait servir à évaluer le degré de risque auquel est exposée une personne aînée.

Problématique

L'*Outil de Dépistage et d'Intervention des Victimes Aîné[e]s* (ODIVA) vise à évaluer le danger ou risque de maltraitance chez les personnes aînées. Cet outil doit cependant être validé avant d'être mis à la disposition de la population.

Méthodologie

L'étude s'est déroulée de 2000 à 2002 aux Services à domicile (SAD) du Canton de Vaud en Suisse. Des intervenants choisis au hasard (échantillon de type accidentel) et représentant l'ensemble des fonctions au SAD ont été appelés à rédiger une histoire de cas d'abus ou de négligence. Ensuite, les participants ont rempli le test ODIVA en lien avec l'histoire de cas rédigée. Un total de 196 situations d'abus ont ainsi été répertoriées et analysées. La prévalence des variables issues de la littérature a été étudiée à travers quatre catégories: le profil de victime, le comportement des victimes, le profil d'abuseur et le comportement des abuseurs.

Résultats

Les quatre premières variables de chaque catégorie se retrouvent dans 40 % des situations de maltraitance, ce qui laisse présager que la présence de ces variables indique un risque de danger assez élevé. De plus, dans plus de 60 % des cas, quatre variables par catégories sont présentes. Ainsi, un seuil de danger pourrait être établi lorsque quatre éléments de chaque catégorie sont présents. L'ensemble des variables est présent dans plus de 9 % des cas de maltraitance étudiés, ce qui confirme leur pertinence. C'est en établissant une valeur chiffrée pour chaque variable en proportion de la fréquence des résultats que la première version du test OVIDA a été construite.

Discussion

La discussion est intégrée aux résultats ci-haut.

Conclusion

Les scores établis grâce à ce test permettent de repérer les personnes âgées à risque de subir de la maltraitance. Ils permettent en outre de distinguer le degré de risque encouru, qu'il soit faible ou fort. Ce test pourrait servir dans une étude de prévalence de la maltraitance au sein des SAD.

Pistes pour la pratique ou la recherche

La suite du projet de recherche pourrait permettre de fixer la valeur prédictive des variables, afin de vérifier la possibilité de cerner une situation présumée de maltraitance grâce à la prévalence de variables déterminées. En outre, la collecte de données se poursuit et vise à atteindre un total de 450 situations répertoriées à la fin de 2006 afin de distinguer les profils de danger en fonction du sexe de la victime.

Date de réalisation de la fiche :

27 mai 2014

